

Какво представлява Западнонилският енцефалит?

Заболяването Западнонилски енцефалит започва остро с втрисане, висока температура, гадене, повръщане, които не могат да бъдат различени от всяка друга остра вирусна инфекция, но много бързо се развива клинична картина на остър енцефалит и менингит, поради което болните се нуждаят от хоспитализация.

Какви са причините за Западнонилския енцефалит?

Ухапване от комар, причинява западнонилския енцефалит.

Какъв е инкубационният период на Западнонилския енцефалит?

Инкубационният период на Западнонилския енцефалит е от 1-6 дни до 14 дни.

Симптоми на Западнонилски енцефалит

t;mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: 13.5pt;">

- Повечето хора, които са заразени (повечето деца) са асимптоматични или имат ☐ симптоми на повръщане и диария.
- Неспецифични симптоми могат да включват: болки в гърлото, болки в гърба, миалгия, артралгия .
- Повечето пациенти със ☐ Западнонилски енцефалит развиват енцефалит или асептичен менингит (менингоенцефалит), или и двете.

· **Налице** е **фебрилно** състояние, придружено от главоболие, психическо объркване, тремор, или парализа.

Симптомите са най-изявени при много млади и при много възрастни хора.

Физически симптоми

- Повечето пациенти са фебрилни и имат треска.
 - Пациентите, които са развили енцефалит, имат умствени смущения или дезориентация и може да са с намалено съзнание.
- Пациенти с тежки случаи на Западнонилски енцефалит може да са със ступор или кома.
- Десет процента от пациентите с Западнонилски енцефалит имат увеличен черен дроб. Приблизително 20% от тях имат спленомегалия.
 - При някои случаи може да се наблюдава фарингит.
 - Приблизително 20% от пациентите, заразени с вируса на Западнонилския енцефалит, имат макулопапуларен обрив.
 - Генерализирана аденопатия и разширения субментален възел не са често срещани при Западнонилския енцефалит.

Как става заразяването със Западнонилския вирус?

-Западнонилският енцефалит обикновено се появява през лятото, когато комарите, диви прелетни птици, и хората са в непосредствена близост помежду си.

-Директното ухапване от тигров комар предизвиква Западнонилския енцефалит. Това обикновено става по време на хранене на комара, което е сутрин рано - при изгрев слънце, или вечер - при залез слънце.

-Ухапвания от комари увеличават риска от заразата с Западнонилски енцефалит.

-Западнонилският вирус може да бъде предадена при трансплантации на органи.

-Западнонилският вирус е открит и в майчината кърма.

Как да се предпазим от Западнонилски енцефалит?

Предпазването от заболяването става чрез рутинните мерки за предпазване от комари – замрежване на прозорците и използване на препарати за предпазване на откритите части на тялото при престой навън.