



Притеснителни симптоми по време на уринирането

Уринирането може да създаде големи проблеми в ежедневието на един човек.

Болният може да уринира свободно или насилвайки се; урината може да се отделя като пълна струя или като тънка струйка; при уринирането могат да се наблюдават болки; възможно е не за-държане или, обратно – задържане на урината. Трябва да се има предвид честотата на позивите. Нормално човек уринира 4 - 6 пъти в денонощие, при това предимно през деня.

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

Задръжка на уринирането

Трябва внимателно да се следи за всяка задръжка на уринирането, тъй като прекратяването на отделянето на урина може да бъде показател за парализа на мехура или спазъм на сфинктера на пикочния канал. Тези явления се наблюдават при възрастни хора, болести на гръбначния и главния мозък; временна парализа на мехура сравнително често се наблюдава у изтощени болни, особено ако те се намират в безсъзнание. В такива случаи урината се изпуска с помощта на катетер. Спиране на уринирането може да се получи и от запушване на пикочния канал с камък, намиращ се в пикочния мехур.

Спиране на уринирането

Пълно спиране на уринирането може да се получи вследствие на това, че поради едни или други причини бъбреците престават да отделят урина; например това се среща при остро възпаление на бъбреците, при отравяне, когато цялата течност от организма се отделя с повръщане и изпражненията. Ясно е, че в подобни случаи пикочният мехур ще се окаже празен, затова няма да се отделя урина.

```
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
```

Непроизволно уриниране

Непроизволно уриниране понякога настъпва у слаби и тежко болни при висока температура, замъглено съзнание, при бълнуване или при безсъзнание. Непроизволно уриниране се наблюдава периодично след насъбиране на урина в пикочния мехур, когато болният, намиращ се в тежко състояние или в безсъзнание, загубва способност да управлява акта на уринирането. Понякога непроизволно уриниране се получава у здрави хора, особено у деца, през време на дълбок сън. В такива случаи е необходимо децата да се будят в определен час през нощта и да се слагат на гърне. Това понякога е достатъчно, за да се предотвратят непроизволните уринирания.

Понякога урината никак не се задържа в пикочния мехур и изтича на капки почти непрекъснато от пикочния канал и това се наблюдава при много слаби и парализирани болни.

